

Supplementary Information

Chemical Compounds from *Ocotea neesiana* (Miq.) Kosterm Demolition Wood and Their Effect on the Growth of *Xanthomonas citri* subsp. *citri*


Jennifer A. O. Lima,^a Helena G. Ramos,^a Junior A. Chaves,^a Claudete C. do Nascimento,^b Luiz Henrique K. Queiroz-Junior,^c Danielle F. da Silva,^d Jéssica Cristina Amaral,^d Maria Fátima das Graças F. da Silva^{id}^d and Maria da Paz Lima^{id}^{*,b}

^aPrograma de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal do Amazonas, 69080-900 Manaus-AM, Brazil

^bCoordenação de Tecnologia e Inovação, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 69067-375 Manaus-AM, Brazil

^cInstituto de Química, Universidade Federal de Goiás, 74001-970 Goiânia-GO, Brazil

^dDepartamento de Química, Universidade Federal de São Carlos, 13565-905 São Carlos-SP, Brazil



Scheme S1. Compounds isolated from the wood residues of *Ocotea neesiana*.

*e-mail: mdapaz@inpa.gov.br

Spectra of the new compound **6**




Figure S1. ¹H NMR spectrum (500 MHz, CD₃OD) of compound **6**.




Figure S2. ¹³C NMR spectrum (125 MHz, CD₃OD) of compound **6**.




Figure S3. DEPT-135 spectrum (125 MHz, CD₃OD) of compound **6**.




Figure S4. HSQC spectrum (500 MHz, 125 MHz CD₃OD) of compound **6**.




Figure S5. HMBC spectrum (125 MHz, CD₃OD) of compound 6.




Figure S6. Mass spectrum of compound 6.

Spectra of the new compound **7**




Figure S7. ^1H NMR spectrum (400 MHz, CD_3OD) of compound **7**.




Figure S8. ^{13}C NMR spectrum (100 MHz, CD_3OD) of compound **7**.




Figure S9. HSQC spectrum (400 MHz, 100 MHz CD₃OD) of compound 7.




Figure S10. HMBC spectrum (100 MHz, CD₃OD) of compound 7.




Figure S11. Mass spectrum of compound 7.