



CHAGAS TEM TRATAMENTO


O tratamento é
disponibilizado pelo SUS.



Se não tratada a doença,
pode afetar gravemente o
coração, esôfago e
intestino.




O tratamento deve ser
iniciado o mais rápido
possível. Não deixe para
depois!



Procure agora um médico!

Não interrompa o
tratamento. Em caso de
efeito colateral, procure um
médico.



DOENÇA DE CHAGAS

FATORES DE RISCO



- ☐ Mora/morou em locais onde tem barbeiro ou próximo a locais onde tem.
- ☐ Mora/morou em casa de madeira, pau a pique, estuque, taipa, sapê ou de barro.
- ☐ Foi picado pelo barbeiro (chupão, chupança, fincão).
- ☐ Recebeu transfusão de sangue antes de 1992.
- ☐ Alguém na sua família tem Chagas.
- ☐ Mora em região endêmica.



**Se você marcou alguma das opções,
procure uma Unidade de Saúde!!!**



FIQUE ATENTO aos SINTOMAS



FASE AGUDA


- Dor de Cabeça
- Inchaço no rosto
- Febre

- Fraqueza
- Dor no corpo
- Vermelhidão na Pele



- Problemas cardíacos
- Batimentos cardíacos irregulares
- Lesão parecida com um furúnculo
- Inchaço na Barriga
- Problemas digestivos

FASE CRÔNICA



**CASO APRESENTE ALGUM
SINTOMA, PROCURE UM POSTO
DE SAÚDE OU UM HOSPITAL
PROXÍMO**

**CHAGAS TEM
TRATAMENTO**

FIQUE ATENTO aos SINTOMAS

CASO APRESENTE ALGUM SINTOMA,
PROCURE UM POSTO DE SAÚDE OU
UM HOSPITAL PROXÍMO !!!

Fase aguda

- Febre persistente
- Dor de cabeça
- Inchaço no rosto
- Fraqueza
- Dor no corpo
- Vermelhidão na pele



Fase crônica



Problemas digestivos

Inchaço na Barriga

Batimentos cardíacos irregulares

Lesão parecida com um furúnculo

Problemas cardíacos

CHAGAS TEM TRATAMENTO

SaMi-Trop



FIQUE ATENTO

aos SINTOMAS

FASE AGUDA

- FEBRE PERSISTENTE (MAIS DE 7 DIAS)
- DOR DE CABEÇA
- FRAQUEZA INTENSA
- INCHAÇO NO ROSTO E PERNAS
- MANCHAS VERMELHAS NA PELE

ÓRGÃOS MAIS AFETADOS



FASE CRÔNICA

- DISTÚRBIOS CARDÍACOS;
- DOR ABDOMINAL;
- CONSTIPAÇÃO;
- DIFICULDADE PARA ENGOLIR;
- PERTURBAÇÕES DIGESTIVAS.





LAFEPE BENZNIDAZOL - 12,5 mg

benznidazol **COMPRIMIDOS**

FÓRMULA: Cada comprimido contém:
benznidazol..... 100 mg
excipiente adequado q.s.p. 1 comprimido

USO PEDIÁTRICO - USO ORAL

**VENDA SOB
PRESCRIÇÃO
MÉDICA**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER
MANTIDO FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS**

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE,
INDICAÇÕES, CONTRA-INDICAÇÕES
E PRECAUÇÕES: VIDE BULA**

**CONSERVAR EM TEMPERATURA
AMBIENTE (ENTRE 15° E 30°C)
PROTEGER DA LUZ E DA UMIDADE**

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
DDG(Fone/Fax): 0800.081.1121**

**Contém: 240 comprimidos
MS: 1.0183.0145.000-0**

FATORES DE RISCO PARA A DOENÇA DE CHAGAS




1

Ter residido na infância ou residir em área com relato de presença do barbeiro com registro de infecção pelo **T. cruzi**.



2

Ter residido ou residir em habitação onde possa ter ocorrido o convívio com o vetor (barbeiro).



3

Morar ou ter vindo de área com registro de transmissão ativa ou com histórico no passado de ocorrência de transmissão.

4

Ter realizado transfusão de sangue antes de 1992.

5



Ter convívio frequente com pessoas ou familiares que tenham o diagnóstico para Doença de Chagas, especialmente filhos com mãe comprovada com a infecção.

TRATAMENTO

O tratamento para a doença de chagas é feito com o uso do medicamento Benznidazol.

Ele deve ser indicado por um médico, após a confirmação do diagnóstico.

É importante que o tratamento não seja interrompido, os efeitos colaterais da medicação são temporários.



Prevenção é o melhor remédio!


A melhor forma de prevenção é impedir a proliferação do inseto transmissor, o "Barbeiro".

Para isso:

- Evite o acúmulo de madeira, telhas e entulho no quintal.
- Mantenha galinheiros e criatórios afastados de casa.
- Tape frestas e buracos na parede.



Como ocorre a transmissão da Doença de Chagas?



As principais formas de transmissão da doença de Chagas são:

- **Vetorial:** contato com fezes de triatomíneos infectados após o repasto/alimentação sanguínea. A ingestão de sangue no momento do repasto sanguíneo estimula a defecação e, dessa forma, o contato com as fezes.



- **Oral:** ingestão de alimentos contaminados com parasitos provenientes de triatomíneos infectados ou suas excretas.




- **Vertical:** ocorre pela passagem de parasitos de mulheres infectadas por *T. cruzi* para seus bebês durante a gravidez ou o parto.



- **Transfusão de sangue ou transplante de órgãos** de doadores infectados a receptores saudáveis.

- **Acidental:** pelo contato da pele ferida ou de mucosas com material contaminado durante manipulação em laboratório ou na manipulação de caça.



VOCÊ JÁ VIU ALGUM DESTES INSETOS?



Eles são conhecidos como barbeiro, chupão ou bicudo e podem transmitir a doença de Chagas.

O que fazer quando encontrá-los?

Não os mate!

Capture o barbeiro vivo.



Entregue o barbeiro vivo no
Posto de Informação de Triatomíneos (PIT) ou na
Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa.