

Tabela Suplementar 1. Características sociodemográficas e comportamentais segundo as práticas alimentares de adultos usuários da Atenção Primária à Saúde de Goiânia, Goiás, Brasil, 2022-2023 (n=783)

Variáveis	Escore de práticas de comensalidade recomendadas (n=783)		Hábito de realizar as refeições sem o uso das telas (n=783)		Hábito de consumir alimentos à mesa (n=783)		Hábito de consumir alimentos com companhia (n=783)	
	Mediana (IIQ)	p-valor	Sim n (%)	p-valor	Sim n (%)	p-valor	Sim n (%)	p-valor
Amostra total^f	2 (1-3)	-	307 (39,2)	-	490 (62,6)	-	605 (77,3)	-
Idade (anos)^a (n=779)	-	-	41 (30-50)	<0,001 ^b	39 (29-48)	0,002 ^b	37 (28-46)	0,762 ^a
18-35	2 (1-2)	<0,001 ^b	106 (34,6)	<0,001 ^c	192 (39,3)	0,006 ^c	258 (42,6)	0,706 ^b
36-59	2 (1-3)		200 (65,4)		297 (60,7)		347 (57,4)	
Sexo (n=783)								
Feminino	2 (1-3)	0,694 ^b	258 (84,0)	0,159 ^c	394 (80,4)	0,262 ^c	497 (82,1)	0,472 ^b
Masculino	2 (1-2)		49 (16,0)		96 (19,6)		108 (17,8)	
Raça/cor da pele (n=781)								
Branca	2 (1-3)a	0,003 ^d	66 (21,5)	0,370 ^c	114 (23,3)	<0,001 ^c	130 (21,5)	0,498 ^b
Preta	2 (1-2)b		42 (13,7)		62 (12,7)		81 (13,4)	
Parda	2 (1-3)a		190 (61,9)		302 (61,8)		368 (60,9)	
Amarela	1 (1-2)c		9 (2,9)		11 (2,2)		25 (4,1)	
Nível de escolaridade (n=781)								
Até fundamental completo	2 (1-3)	0,292 ^d	112 (36,6)	0,260 ^c	158 (32,3)	0,055 ^c	210 (34,8)	0,571 ^b
Médio completo	2 (1-3)		146 (47,7)		247 (50,5)		306 (50,7)	
Superior completo	2 (1-3)		48 (15,7)		84 (17,2)		88 (14,6)	
Renda mensal familiar (salários-mínimos) (n=747)								
<1	2 (1-2)	0,129 ^d	18 (6,2)	0,787 ^c	32 (6,9)	0,001 ^c	43 (7,4)	0,329 ^b
1	2 (1-3)		87 (29,9)		125 (26,8)		170 (29,4)	
2-3	2 (1-3)		130 (44,7)		208 (44,6)		270 (46,6)	

Variáveis	Escore de práticas de comensalidade recomendadas (n=783)		Hábito de realizar as refeições sem o uso das telas (n=783)		Hábito de consumir alimentos à mesa (n=783)		Hábito de consumir alimentos com companhia (n=783)	
	Mediana (IIQ)	p-valor	Sim n (%)	p-valor	Sim n (%)	p-valor	Sim n (%)	p-valor
4-5	2 (1-3)		33 (11,3)		57 (12,2)		56 (9,7)	
>5	2 (1-3)		23 (7,9)		44 (9,4)		40 (6,9)	
Índice de massa corporal (kg/m²)^a	-	-	26,5 (23,5-30,8)	0,267 ^b	26,40 (23,3-30,3)	0,477 ^b	26,13 (23,1-30,3)	0,517 ^b
Estado nutricional (n=761)								
Baixo peso	2 (1-2)	0,982 ^c	7 (2,3)	0,430 ^c	18 (3,8)	0,908 ^c	23 (3,9)	0,865 ^d
Eutrofia	2 (1-3)		113 (37,8)		182 (38,1)		221 (37,6)	
Sobrepeso	2 (1-3)		98 (32,8)		145 (30,3)		186 (31,7)	
Obesidade	2 (1-3)		81 (27,1)		133 (27,8)		157 (26,7)	
Uso de tabaco (n=747)								
Sim	1 (1-2)	<0,001 ^b	24 (8,1)	0,054 ^c	33 (7,0)	<0,001 ^c	51 (8,8)	0,001 ^c
Não	2 (1-3)		271 (91,9)		435 (92,9)		525 (91,1)	
Uso de álcool (n=747)								
Sim	2 (1-2)	0,330 ^b	100 (33,8)	0,035 ^c	188 (40,2)	0,203 ^c	216 (37,5)	0,343 ^c
Não	2 (1-3)		196 (66,2)		280 (59,8)		360 (62,5)	
Nível de atividade física (n=757)								
Sedentário	2 (1-2)	<0,001 ^c	140 (46,8)	0,005 ^c	214 (45,2)	0,000 ^c	293 (50,2)	0,059 ^c
Moderado	2 (1-3)		91 (30,4)		134 (28,4)		148 (25,3)	
Ativo	2 (1-3)		58 (19,4)		111 (23,5)		129 (22,1)	
Muito ativo	2 (1-2)		10 (3,3)		13 (2,7)		14 (2,4)	

Notas: ^aValores apresentados em mediana (variação interquartil). ^bTeste de U de Mann-Whitney; ^cTeste qui-quadrado de Pearson; ^dTeste exato de Fisher; ^eTeste Kruskal-Wallis; ^fAlgumas variáveis apresentam n<783 devido aos dados faltantes.